

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	?	0	Z	A	M	EI
Wieren	Draadwieren massaal	<i>Filamentous algae</i>						
	viltwier	<i>Codium fragile</i>						
	japans bessenwier	<i>Sargassum muticum</i>						
Planten	Aardvederkruid	<i>Myriophyllum spicatum</i>						
	Vallisneria	<i>Vallisneria spiralis</i>						
	Gekroesd fonteinkruid	<i>Potamogeton crispus</i>						
	Rivierfonteinkruid	<i>Potamogeton nodosus</i>						
	Schedefonteinkruid	<i>Potamogeton pectinatus</i>						
Sponzen	Waterpest	<i>Elodea spec</i>						
	Echte zoetwaterspons	<i>Ephydatia fluviatilis</i>						
	Geweispons	<i>Haliclona oculata</i>						
	Boorspons	<i>Cliona celata</i>						
Kwallen en hydroïdpolpen	Oorkwal	<i>Aurelia aurita</i>						
	Gesteelde zoetwaterpoliep	<i>Pelmatohydra oligactis</i>						
	Brakwaterpoliep	<i>Cordylophora caspia</i>						
	Zoetwaterkwal	<i>Craspedacusta sowerbii</i>						
Anemonen	Wedueroos	<i>Sagartiogeton undatus</i>						
	Slibanemoon	<i>Sargatia troglodytes</i>						
	Baksteenanemoon	<i>Diadumene cincta</i>						
Ribkwal en	Zeedruif	<i>Pleurobrachia pileus</i>						
	Amerikaanse ribkwal	<i>Mnemiopsis leidyi</i>						
	Slank meloenkwalletje	<i>Beroë gracilis</i>						
Hydroïd-pollepen								
Wormen en wormachtigen	Kleine hoefijzerworm	<i>Phoronis hippocrepia</i>						
	Langste snoerworm	<i>Lineus longissimus</i>						
	Trompetkalkkokerworm	<i>Ficopomatus enigmaticus</i>						
	Tweedradige kokerworm	<i>Polydora ciliata</i>						
Huisjesslakken en keverslakken	Wulk	<i>Buccinum undatum</i>						
	Gevlochten fuikhoren	<i>Nassarius reticulatus</i>						
	Jenkins waterhoren	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>						
	Kleine diepslak	<i>Bithynia leachi</i>						
	Vijverpluimdrager	<i>Valvata piscinalis</i>						
	Stompe moerasslak	<i>Viviparus viviparus</i>						

	Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	?	0	Z	A	M	EI
Naaktslakken	Grote vlokslak	<i>Aeolidia papillosa</i>						
	Brakwaterknotsslak	<i>Tenellia adspersa</i>						
Tweekleppigen	Aziatische korfmossel	<i>Corbicula fluminea</i>						
	Bolle stroommossel	<i>Unio tumidus</i>						
	Platte oester	<i>Ostrea edulis</i>						
	Japanse oester	<i>Crassostrea gigas</i>						
	Driehoeksmossel	<i>Dreissena polymorpha</i>						
	Quaggamossel	<i>Dreissena bugensis</i>						
	Brakwatermossel	<i>Mytilopsis leucophaeata</i>						
	Mossel	<i>Mytilus edulis</i>						
Inktvissen	Dwerginktvijl	<i>Sepiolo atlantica</i>						
Kreeften en krabben	Europese zeekreeft	<i>Homarus gammarus</i>						
	Strandkrab	<i>Carcinus maenas</i>						
	Penseelkrab	<i>Hemigrapsus takanoi</i>						
	Zuiderzeekrabbetje	<i>Rhithropanopeus harrisii</i>						
	Chinees wolhandkrab	<i>Eriocheir sinensis</i>						
	Pontokaspisch vlokreeft	<i>Dikerogammarus villosus</i>						
	Gevlekte Amerikaanse rivierkre	<i>Orconectes limosus</i>						
Aasgarnalen Gamalen	Roodbuik-aasgarnaal	<i>Hemimysis lamornae</i>						
	Geknikte aasgarnaal	<i>Praunus flexuosus</i>						
	Langneussteurgarnaal	<i>Palaemon longirostris</i>						
	Brakwatersteurgarnaal	<i>Palaemonetes varians</i>						



Zoekbeeld

Zoetwaterplant. De stengels zijn naar boven toe vertakt en bovenaan zigzagsgewijs geknikt en afgeplat, met twee groeven. De ondergedoken bladeren zijn glanzend heldergroen of rossig, smal langwerpig, gegolfd, gekroesd, gezaagd en doorschijnend. Ze hebben een halfstengelomvattende voet, een afgeronde top en worden 0,5-1,5 cm breed en tot 10 cm lang. Aan de top van de bladrand zitten scherpe tandjes en vaak ook langs de rest van de bladrand. De steunblaadjes zijn klein en niet vergroeid.

Habitat en ecologie

Zonnige plaatsen in niet te ondiep, helder, matig voedselrijk tot voedselrijk, soms iets vervuild, zoet, zelden zwak brak, stilstaand of zwak stromend, zwak zuur tot kalkrijk water met een bodem van zand, leem, zavel en klei met weinig organische stof.

Literatuur

De website: Wilde-planten.nl

Code

594796

Auteurs

[Niels Schrieken, juni 2016]

Categorieën: Soorten, Vaatplanten

Commentaar



Grafieken



Klik op de foto's voor grotere plaatjes.




Gekroesd fonteinkruid, *Potamogeton crispus* (foto: Richard de Kok)

Haringvliet, Den Bommel, 05-06-2016

Item 1 of 5







Stichting ANEMOON

[Menu](#) ▼

You are here: [Flora en Fauna](#) >> [Soorteninformatie](#) >> [Soorten](#)


Soorten

[Huidige artikelen](#) | [Archieven](#) | [Zoek](#)



Dwerginktvis

Sepiola atlantica d'Orbigny, 1842



Zoekbeeld

Tienarmige inktvis. Mariene soort. Tot ca. 5 cm. Melkachtig transparant, met bruinrode en gele pigmentvlekjes. Kleine soort met plomp, zakvormig lichaam, aan de rugzijde met de kop vergroeid. Aan de kop 5 paar armen, waarvan één paar langer. Aan weerszijden een ronde flapvormige vin. Schelp: 18 mm, inwendig, chitineus zonder kalk. Ondiep tot 90 m. Noordzee, Waddenzee, Zeeland (Ooster- en Westerschelde, Grevelingen).

Te verwarren met

Jonge Zeekatten, maar gemakkelijk te onderscheiden door het ontbreken van de gesloten vinzoom om het lichaam. Aan weerszijden zitten ronde oorvormige flapjes (bij een jonge Zeekat is dit een zoom die het gehele lichaam omsluit).

Kenmerken

Afmetingen: Totale lengte tot ca. 5 cm.

Lichaamskleur: Het lichaam is melkachtig transparant, met veel bruinrode en gele pigmentvlekjes. Doordat deze vlekjes (chromatoforen) razendsnel in grootte kunnen veranderen, kan het dier snel van kleur veranderen.

Lichaamsvorm: Kleine soort met een plomp, zakvormig lichaam. Aan de rugzijde is het lichaam met de kop vergroeid. Aan de kop zitten 5 paar armen, waarvan één paar langer is.

Armen: De Dwerginktvissen bezit 5 paar armen. Één paar armen is langer en wordt gebruikt om prooi mee te vangen. Elke arm bevat 2 tot 8 zuignapjes. Bij het mannetje bevat één arm een groef, waarmee het sperma in de lichaamsopening van het vrouwtje gebracht wordt.

Vinnen: Rondom het lichaam zit aan weerszijden een ronde flapvormige vin van ca 10 mm diameter.

Schelp: een skelet ontbreekt. Het dier bezit alleen een chitineus inwendig rugschild, dat ca 18 mm lang kan zijn. Dit schild bevat geen kalk, zoals bij de zeekat, zodat het nagenoeg transparant is.

Overig: (Zoektip) Dwerginktvissen leven op zachte bodems, waar ze zich kunnen ingraven bij gevaar. De dieren zijn doorgaans nieuwsgierig en komen weer tevoorschijn als je geduldig bent. Het ondiepe water bij het Koepeltje is een goede plek om te zoeken.

Habitat en ecologie

Pelagische bodembewoner van ondiepe kustwateren en estuaria, tot 90 m diep. De dieren liggen in zachte bodems ingegraven in het zand te wachten op een prooi, die vanuit deze hinderlaag wordt buitgemaakt. Het voedsel bestaat vooral uit jonge garnalen en aasgarnalen. De dieren zijn van gescheiden geslacht. De 3 mm grote eieren worden in ongekleurde doorzichtige trosjes van ten hoogste 50 stuks gelegd en aan allerlei substraat vastgemaakt.

Areaal en verspreiding

Van Noorwegen langs alle kusten van Noordwest-Europa tot Marokko. Waar de waterdiepte meer dan 50-60 m bedraagt, wordt de kans op andere *Sepioida*-soorten groter. Bij rotskusten met baaien komen de dieren soms wel in de baai, maar niet daarbuiten voor. Uit Nederland is de Dwerginktvissen bekend van Zeeland, de Waddenzee en de Noordzee. Vooral in het Oosterschelde-bekken en Grevelingenmeer vaak door duikers waargenomen. In het late voorjaar soms in strandpoelen en zwinnen. De soort wordt regelmatig door garnalenkotters gevangen en is ook als kornetvangst gemeld.

Exoten informatie

Link: [Waarnemingen doorgegeven aan telmee.nl van 1997 t/m 2015.](#)

Literatuur

- Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.
- Bragt, P.H. van, 2014. Inktviseieren met pasen. Spuisluis.

Code

141454

Auteurs


Mat Vestjens
Brendan Oonk

Categorieën: Soorten, Weekdieren, Inktvissen

Gerelateerde artikelen


Rugschild Zeekat
Zeekat

Commentaar




Grafieken

Sepiolo atlantica
Grevelingen




© Stichting ANEMOON, 2014

Sepiolo atlantica
Oosterschelde




© Stichting ANEMOON, 2014

Sepiolo atlantica
Grevelingen




© Stichting ANEMOON, 2014

Sepiolo atlantica
Oosterschelde




© Stichting ANEMOON, 2014

Sepiolo atlantica
Grevelingen




© Stichting ANEMOON, 2014

Sepiolo atlantica
Oosterschelde




© Stichting ANEMOON, 2014



Dwerginktvis, *Sepoila atlantica* (foto: Miranda Schagen)
Oosterschelde, Zeelandbrug, 13 mei 2015

Item 1 of 1





Commentaar overzicht

Netwerkspons

Eerste foto Marco Faasse, tweede foto Luna van der... Floris Bennema

Wrattige mosdierslak

2 wrattige mosdierslakjes gezien op 20 september 2... Will Berg

Tiendoornige stekelbaars

Foto lijkt niet op een tiendoornige Adriaan Gmelig Meyling

Vorskwab

Op 31 augustus bij Den Osse Kerkweg een vorskwab g... Marco Akerboom

Vorskwab

Niet gelukt , hij zwom steeds weg Stefan Verheyen

Vorskwab

Bedankt voor de waarneming Stefan. Je waarneming s... Niels Schrieken

Vorskwab

Op 10 aug 2016 ter hoogte van het gemaal een vorsk... Stefan Verheyen

Eikapsel Stekelrog

de afmetingen moeten millimeters zijn, geen centim... Gijs Doeglas

Maze coral

De namen van de fotografen zijn niet meer zichtbaa... Floris Bennema

Grooved brain coral

Photo Marion is Symetrical brain coral Pseudodiplo... Floris Bennema



Stichting ANEMOON

[Menu](#) ▼

You are here: [Flora en Fauna](#) >> [Soorteninformatie](#) >> [Soorten](#)

Soorten

[Huidige artikelen](#) | [Archieven](#) | [Zoek](#)



Viltwier

***Codium fragile* (Suringar) Hariot, 1889**



Zoekbeeld

Zeewier. Groenwier. Viltwier is een makkelijk te herkennen wiersoort en wordt gekenmerkt door relatief dikke, donkergroene 'takken' met een witte dons laag (vandaar de naam viltwier). Door dit robuuste uiterlijk valt viltwier makkelijk op tussen het overige fijne wier dat een veel wolliger karakter heeft. In de wintermaanden kan viltwier een wat dunner en bleker uiterlijk hebben.

Areaal en verspreiding

Nederland, Oosterschelde.

Literatuur

- [Perk, F. Determinatietabel wieren SMP dag 2015.](#)

Code

145086

Auteurs

[Luna van der Loos, juli 2014]


Gerelateerde artikelen

Vederwier

Commentaar



Grafieken



Klik op de foto's voor grotere plaatjes.



Commentaar overzicht

Netwerkspons

Eerste foto Marco Faasse, tweede foto Luna van der... Floris Bennema

Wrattige mosdierslak

2 wrattige mosdierslakjes gezien op 20 september 2... Will Berg

Tiendoorrige stekelbaars

Foto lijkt niet op een tiendoorrige Adriaan Gmelig Meyling

Vorskwab

Op 31 augustus bij Den Osse Kerkweg een vorskwab g... Marco Akerboom

Vorskwab

Niet gelukt , hij zwom steeds weg Stefan Verheyen

Vorskwab

Bedankt voor de waarneming Stefan. Je waarneming s... Niels Schrieken

Vorskwab

Op 10 aug 2016 ter hoogte van het gemaal een vorsk... Stefan Verheyen

Eikapsel Stekelrog

de afmetingen moeten millimeters zijn, geen centim... Gijs Doeglas

Maze coral

De namen van de fotografen zijn niet meer zichtbaa... Floris Bennema

Grooved brain coral

Photo Marion is Symmetrical brain coral Pseudodiplo... Floris Bennema